

# 感染症の登園基準

きよし幼稚園

| 第1種 |  | 病名  |   |   |                                       |
|-----|--|---|---|---|---------------------------------------|
|     |  | エボラ出血熱<br>クリミア・コンゴ出血熱<br>ペスト<br>マールブルグ病<br>ラッサ熱<br>急性灰白髄炎 | ジフテリア<br>南米出血熱<br>重症急性呼吸器症候群<br>鳥インフルエンザ<br>新型インフルエンザ | (第3種)<br>腸チフス<br>パラチフス<br>腸管出血性大腸菌感染症<br>コレラ<br>細菌性赤痢 |                                       |
|     |  |   |   |   | 原則入院治療するまで<br>感染源となる期間は<br>出席停止となります。 |
| 第2種 |  | 病名  | 潜伏期間  | 感染可能期間  | 主な症状                                  |
| 1   |  | インフルエンザ<br>(様疾患)  | 1~2日  | 感染後約10日   | 発熱、全身倦怠、筋肉痛、鼻カタル、<br>咽頭痛、咳            |
| 2   |  | 百日咳   | 6~15日   | 感染後約3週  | 発作性咳の長期反復、持続                          |
| 3   |  | はしか(麻疹)   | 10~12日  | 発疹出現の前<br>後4~5日                                       | 上気道のカタル、発熱、<br>粘膜疹コプリック斑              |
| 4   |  | おたふくかぜ<br>(流行性耳下腺炎)                                       | 14~24日  | 明らかな症状を<br>示す7日前から<br>その後9日続く                         | 発熱、耳下腺、舌下腺、顎下腺の<br>腫脹及び圧痛             |
| 5   |  | 三日はしか(風疹)   | 14~21日  | 発疹出現の前<br>後7日間  | 種々の発疹、軽熱、リンパ腺腫大                       |
| 6   |  | 水ぼうそう(水痘)   | 11~20日  | 水痘発現前<br>2~後6日  | 軽熱、被覆部に発疹、斑点丘疹状<br>→水疱→顆粒状痂皮          |
| 7   |  | プール熱(咽頭結膜熱)   | 5~6日  | 潜伏期後半~<br>発症後約5日間                                     | 発熱、全身症状、<br>咽頭炎と結膜炎の合併症               |
| 8   |  | 結核  | 2年以内  | 喀痰の塗抹検査陽<br>生の間                                       | 初期無症状・倦怠感、微熱、寝汗、咳等                    |
| 9   |  | 髄膜炎菌性髄膜炎  | 1~10日   | 有効な治療をして24<br>時経過するまで                                 | 発熱、頭痛、意識障害、嘔吐。劇症型<br>感染症              |
|     |  | 10 流行性角結膜炎  | 1週間以上   | 発病後約2週間   | 軽熱、頭痛、全身倦怠、結膜の炎症、<br>眼瞼浮腫、目やに         |
|     |  | 11 急性出血性結膜炎   | 1~2日  | 発病後約4日  | 流涙、結膜充血、眼瞼浮腫、滲出液                      |
|     |  | 12 溶連菌感染症   | 2~4日  | 潜伏期後半~<br>発症後約7日間                                     | 発熱、咽頭痛、扁桃腺炎、莓舌、<br>頸部リンパ節炎、全身に発疹      |
|     |  | 13 マイコプラズマ肺炎<br>(うつる肺炎)                                   | 10~24日  |   | 咳、発熱、呼吸困難(重症の場合)                      |
|     |  | 14 ヘルパンギーナ  | 2~7日  |   | 高熱、咽頭痛、咽頭に水疱                          |
|     |  | 15 手足口病   | 2~7日  | 水疱消滅まで  | 感冒様症状、<br>手足口に赤斑→水疱                   |
|     |  | 16 りんご病(伝染性紅斑)  | 17~18日  | 14~20日  | 顔面赤斑とくに頬部の赤斑性発疹                       |
|     |  | 17 感染性胃腸炎<br>(小型球形ウイルス・SRSV)                              | 1~3日  |   | 発熱、腹痛、下痢                              |
|     |  | 18 突発性発疹  | 約10日  |   | 高熱、3日後に全身に発疹                          |
|     |  | 19 ヘルペス性歯肉口内炎<br>(単純ヘルペス感染症)                              | 2日~2週間  |   | 口内炎症                                  |
|     |  | 20 とびひ<br>(伝染性膿痂疹・<br>皮膚化膿症)                              | 2~10日   | 水疱消滅まで  | 主として豆つぶ大の水疱自覚症状<br>あまりなし(プールは厳禁)      |
|     |  | 21 水いぼ(伝染性軟属腫)  | 14~50日  |   | 球状のいぼ                                 |
|     |  | 22 アタマジラミ   | 1ヶ月程  | 10日程  | 頭がかゆい                                 |

医師の診断を受け、治癒証明書を提出してください。

医師の許可が必要があれば、治癒証明書を提出してください。

# 治癒証明書

きよし幼稚園

|            |                     |
|------------|---------------------|
| 園児名        |                     |
| 病名         |                     |
| 期間         | 令和 年 月 日から<br>月 日まで |
| 病院・医院名&医師名 |                     |
| 印          |                     |